

Neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (nAMD)

## **Neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (nAMD)**

Laut der Stellungnahme der Fachgesellschaften von 2020 ist die erfolgreiche Reduktion retinaler Flüssigkeit von zentraler Bedeutung, um den Visus bei Patienten mit neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration bestmöglich zu erhalten. Besonders zu Therapiebeginn ist eine konsequente Reduktion aller Formen von retinaler Flüssigkeit ausschlaggebend. Zur Diagnose und Verlaufskontrolle einer nAMD kommt der Spektraldomänen-Optischen-Kohärenztomographie (SD-OCT) eine wichtige Rolle zu – um Flüssigkeit frühzeitig zu detektieren und behandeln zu können.

### **Aktuelle Erkenntnisse zu Diagnose und Therapie der nAMD**

Ob Fragen zu individuellen Behandlungsschemata, erhellende Real-Life-Daten zur Therapie oder spannende Fallbeispiele: Hier finden Sie alles Wissenswerte rund um die nAMD! Da einige Inhalte dem Heilmittelwerbegesetz (HWG) unterliegen, sind Registrierung und Anmeldung für die Nutzung erforderlich.

Image



#### **Konsensuspapier mit drei neuen nAMD-Subtypen**

Aus CNV wird eine MNV mit drei Subtypen – welche Ziele die neue Terminologie verfolgt.

[Weiterlesen](#)

# Medizinischer InfoService

Bei medizinisch-wissenschaftlichen Fragen, Nebenwirkungsmeldungen oder Reklamationen zu unseren Produkten und Indikationen kontaktieren Sie bitte unseren [Medizinischen InfoService](#).

Telefon: [0911 273 12100](tel:091127312100) / Fax: [0911 273 12160](tel:091127312160) / E-Mail: [infoservice.novartis@novartis.com](mailto:infoservice.novartis@novartis.com) / Chat: [www.chat.novartis.de](http://www.chat.novartis.de)

Der medizinische InfoService ist montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.

---

**Source URL:**

<https://www.pro.novartis.com/de-de/public/therapiegebiete/ophthalmologie/neovaskulaere-alterbedingte-makuladegeneration-namd>