

Scemblix®
Image



Image



Sobre SCEMBLIX®

Sobre SCEMBLIX®

SCEMBLIX®: primer tratamiento para pacientes adultos con LMC-FC Ph+ previamente tratados con ≥ 2 ITKs^{1,2}

See more details

Hide details



MECANISMO DE ACCIÓN

Mecanismo de acción

Mecanismo de acción

SCEMBLIX[®] (asciminib) es el primer y único inhibidor STAMP¹.

See more details

Hide details



EFICACIA Y SEGURIDAD

Eficacia y seguridad**Eficacia y seguridad**

La eficacia y la seguridad clínica de SCEMBLIX® (asciminib) se evaluaron en el estudio ASCSEMBL¹.

[See more details](#)

Hide details



PUBLICACIONES DE INTERÉS

Publicaciones de interés

Publicaciones de interés

Accede a toda la evidencia publicada sobre SCEMBLIX®.

See more details

Hide details



DOSIFICACIÓN Y MANEJO

Dosificación y manejo**Dosificación y manejo**

La dosis recomendada de SCEMBLIX® (asciminib) es 40 mg dos veces al día, con un intervalo de 12 horas aproximadamente¹.

[See more details](#)

Hide details



CASOS CLÍNICOS

Casos clínicos**Casos clínicos**

Casos clínicos reales de pacientes tratados con SCEMBLIX® expuestos por profesionales.

[See more details](#)

Hide details



Vídeo lanzamiento SCEMBLIX®

Vídeo lanzamiento SCEMBLIX®

Un nuevo paradigma de tratamiento para los pacientes con LMC tras 2 ITKs.

[See more details](#)

Hide details



GUÍAS Y MANUALES

▼  **SCSEMBLIX[®]**
(asciminib) comprimidos de 20 mg y 40 mg

Guías y manuales SCEMBLIX®

Guías y manuales SCEMBLIX®

SCEMBLIX® Accede a guías y materiales con información destacada sobre SCEMBLIX®.

See more details

Hide details



**PREGUNTAS
FRECUENTES SOBRE
EL MANEJO DE LA LMC,**
Respondidas por especialistas

Preguntas frecuentes sobre el manejo de la LMC

Preguntas frecuentes sobre el manejo de la LMC

Respondidas por especialistas

[See more details](#)

Hide details

(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Con receta médica. Diagnóstico Hospitalario. Reembolsado por el SNS, con dispensación limitada, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales. PVLn Scemblix 20 mg 60 comprimidos 5.369 €. PVLn Scemblix 40 mg 60 comprimidos 5.369 €.

[Ficha técnica Scemblix®](#)

FC: fase crónica; **ITK:** inhibidor de la tirosina cinasa; **LMC:** leucemia mieloide crónica; **Ph+:** cromosoma Filadelfia positivo; **STAMP:** dirigido específicamente al bolsillo miristoilo de ABL, por sus siglas en inglés.

Referencias

1. Ficha Técnica de SCEMBLIX® (asciminib).

2. Choi E-J. Asciminib: the first-in-class allosteric inhibitor of BCR::ABL1 kinase. Blood Res 2023;58:S29-S36.

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/es-es/hematopro/patologias/lmc/scemblixr>