

Decisiones compartidas
Image

**Esclerosis
Múltiple**



**Decisiones
compartidas**



Image

Esclerosis Múltiple

**Decisiones
compartidas**



Decisiones compartidas

Pacientes con EMR y toma de decisiones compartidas³

La elección de iniciar el tratamiento debe ser una **decisión informada y compartida entre el paciente con EM y su médico**, y debe considerar todos los tratamientos apropiados.

La toma de decisiones compartida fomenta la adherencia y puede mejorar los resultados de los pacientes.¹

Image



Consideraciones clínicas

- Eficacia
- Tolerabilidad
- Seguridad
- Síntomas enfermedad
- Cambios en la RM
- Comorbilidades
- Características inherentes del paciente



Consideraciones del paciente

- Administración y monitorización
- Consideraciones del estilo de vida / trabajo / familia
- Dificultades en cumplimiento y adherencia
- Aspectos psicosociales
- Consideraciones económicas

La evolución de la enfermedad, los valores, las necesidades, las limitaciones y el estilo de vida de la persona con EM deben ser evaluados en paralelo a los beneficios y riesgos potenciales de los tratamientos específicos.¹

Poner en marcha un proceso de toma de decisiones compartido que incorpore el diálogo entre los pacientes con EM y los profesionales sanitarios va a ser fundamental para conseguir el éxito del tratamiento.¹

Image

Consideraciones a tener en cuenta en la decisión del tratamiento


- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Paciente joven con un estilo de vida activo y con posibles consideraciones en lo que se refiere a la familia y al trabajo • Con un tratamiento eficaz que fue elegido a través de una decisión informada y compartida • Dificultad en el tiempo o en la distancia hasta el centro de infusión / hospital | <ul style="list-style-type: none"> • Carga del tratamiento en referencia a la monitorización o a los tratamientos IV previos • Paciente que tiene problemas con la adherencia al tratamiento • Paciente con la enfermedad que progresa que está listo para cambiar de tratamiento • Con problemas relacionados con los efectos adversos | <ul style="list-style-type: none"> • Comprometido debido a las comorbilidades • Con una puntuación elevada en lo que se refiere a su discapacidad • Con deterioro cognitivo precoz |
|--|---|---|

[Vídeos relacionados](#)

Estrategia terapéutica recomendada¹

Image

Objetivo: maximizar la salud cerebral a lo largo de toda la vida



TME: tratamiento modificador de la enfermedad.

Referencia

1. Giovannoni G, Butzkueven H, Dhib-Jalbut S, et al. Brain health: time matters in multiple sclerosis. *Mult Scler Relat Disord*. 2016;9 Suppl 1:S5- S48.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/es-es/neurologia/esclerosis-multiple/que-es-la-em/decisiones-compartidas>