Prise en charge de l’urticaire chronique spontanée selon les dernières recommandations françaises et internationales : diagnostic et évaluation

Image



Image



Prise en charge de l’urticaire chronique spontanée selon les dernières recommandations françaises et internationales : diagnostic et évaluation

L'urticaire chronique spontanée touche environ 0,5 à 1 % de la population à travers le monde1. Afin de vous accompagner dans le diagnostic et la prise en charge des patients atteints d'UCS, retrouvez dans la vidéo ci-dessous les **témoignages d’experts** des **Dr**

Pascale MATHELIER-FUSADE et **Dr Antoine BADAOUI** sur les enjeux du diagnostic de l’urticaire en dermato-allergologie.

VIDEO

Également à votre disposition, une **brochure clé en main,** conforme aux recommandations internationales 2021 et françaises 2019 permettant de répondre aux 4 questions suivantes:

Image

Quand faut-il suspecter l’UCS ?

- Les signes caractéristiques de l’urticaire
- Différence entre urticaire aigüe et urticaire chronique (UC)
- Fréquences des signes et symptômes
- Facteurs déclenchants et différences entre UCS et UC inductible (UCI)

Image

Comment se fait le diagnostic ?

- Histoire de la maladie/anamnèse
- Examen clinique
- Tests diagnostics
- Confirmation du diagnostic et élimination des diagnostics différentiels

Image

Comment évaluer le patient ?

- Les différents scores d'évaluation de la pathologie
- Zoom sur le score de l'UCT mis en avant dans les recommandations internationales 2021

Image

Quelles sont les recommandations de prise en charge thérapeutique de l'UCS ?

- La règle des 3 A en anglais : Adjust (Ajuster), Assess (Évaluer), Act (Agir)
- La prise en charge de l’UCS selon les recommandations internationales et françaises

Image

Immunologie
Urticaire

Diagnostic et prise en charge des patients atteints d'Urticaire Chronique Spontanée (UCS)

Selon les recommandations internationales 2022 et les recommandations françaises 2019 [1,2]

NOVARTIS | Reimagining Medicine

Diagnostic et prise en charge de l'UCS

PDF
Téléchargez

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure "Diagnostic et prise en charge de l'UCS" et obtenez des réponses à ces questions.

UCS : Urticaire Chronique Spontanée

Référence

1. Maurer M *et al*. The burden of chronic spontaneous urticaria is substantial: Real-world evidence from ASSURE-CSU. *Allergy*. 2017, 72:2005–2016.

Articles associés

Article

4 mins

Les différentes formes cliniques d’urticaire et les diagnostics différentiels

Urticaire chronique spontanée
Article - 18 nov 2024

4 mins

Les différentes formes cliniques d’urticaire et les diagnostics différentiels

L’urticaire se caractérise par des papules qui démangent et/ou un angiœdème. Cependant, l'érythème lié à la papule peut être plus difficile à détecter sur certains types de peau...

Urticaire chronique spontanée

Facebook X LinkedIn

Plus de détails

Masquer

Source URL:
https://www.pro.novartis.com/fr-fr/aires-therapeutiques/dermatologie/UCS/diagnostic/prise-en-charge-de-lurticaire-chronique-spontanee