

Novartis LAR 常见问题 FAQ

Novartis LAR 常见问题 FAQ

Novartis LAR 常见问题 FAQ 旨在为您提供有关 LAR 的详细信息。如果您有任何疑问，请随时联系我们。您可以通过[联系我们](#)或[访问我们的网站](#)获取更多信息。

Novartis LAR 常见问题 FAQ 旨在为您提供有关 LAR 的详细信息。如果您有任何疑问，请随时联系我们。

[联系我们](#)

[访问我们的网站](#)

[联系我们](#)

1. 常见问题

Novartis LAR 常见问题 FAQ 旨在为您提供有关 LAR 的详细信息。如果您有任何疑问，请随时联系我们。

Store at 5°C (41°F) or lower.
Store at 20°C to 25°C (68°F to 77°F) excursions permitted to 15°C (59°F) to 30°C (86°F) for a maximum of 6 months.
Store at 20°C to 25°C (68°F to 77°F) excursions permitted to 15°C (59°F) to 30°C (86°F) for a maximum of 6 months.

Store at 20°C to 25°C (68°F to 77°F) excursions permitted to 15°C (59°F) to 30°C (86°F) for a maximum of 6 months.
Store at 20°C to 25°C (68°F to 77°F) excursions permitted to 15°C (59°F) to 30°C (86°F) for a maximum of 6 months.
Store at 20°C to 25°C (68°F to 77°F) excursions permitted to 15°C (59°F) to 30°C (86°F) for a maximum of 6 months.

2024-07

Storage and Handling

At room temperature (20°C to 30°C or 70°F to 86°F), Sandostatin is stable for 14 days if protected from light.

At 20°C to 30°C, Sandostatin is stable for 14 days.

14.1 14.1.1

14.1.1

14.1.2 30

14.1.2

LAR 14.1.2

LAR

LAR¹⁰

LAR

14.1

14.1.3

LAR 10 30

1) LAR 14.1

LAR

3.

