


組織型別生存率（海外データ）




対象・方法：SEER(Surveillance, Epidemiology, and End Results)の登録データから、1998～2001年の米国における悪性軟部腫瘍28,758例（20歳以上）の組織型別生存率を評価した。

Ries LAG, Young JL, Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-J (editors).
SEER Survival Monograph: Cancer Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988-2001,
Patient and Tumor Characteristics. National Cancer Institute,
SEER Program, NIH Pub. No. 07-6215, Bethesda, MD, 89-92 (2007)

Image

病期別生存率（海外データ）

■ 5年無病生存率 ■ 5年全生存率



対象・方法：MSKCC(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)にて1982年7月～2001年6月末までに治療を受けた悪性軟部腫瘍患者1,097例の生存率を評価した。

Edge S, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A (editors). AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed, Springer, 291-298 (2009)

1 悪性軟部腫瘍の診断と治療 (2012)

2 悪性軟部腫瘍の診断と治療 (2012)

3 Ries LAG, Young JL, Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-J (editors). SEER Survival Monograph: Cancer Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988-2001, Patient and Tumor Characteristics. National Cancer Institute, SEER Program, NIH Pub. No. 07-6215, Bethesda, MD, 89-92 (2007)

4 Edge S, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A (editors). AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed, Springer, 291-298 (2009)

[悪性軟部腫瘍\(STS\)の診断と治療](#)

[悪性軟部腫瘍の診断と治療](#)

[悪性軟部腫瘍](#)

Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/votrient/sarcoma/sts_feature