NOVARTIS

治療抵抗性統合失調症の一般的概念

クロザリル

クロザリルの適正使用の流れ

治療抵抗性統合失調症の一般的概念

「統合失調症の診断が確定していて、かつ数種類の抗精神病薬を十分な期間、十分な量投与したにもかかわらず、十分な反応を示さない症例」

多くの場合、以下の二つに分けて考えられている。

- 反応性不良：それぞれの抗精神病薬を十分量投与しても十分な改善が見られない場合
- 耐容性不良：コントロール不良の錐体外路症状などの副作用の問題によって十分量の抗精神病薬を投与できない場合

Image

反応性不良
耐容性不良

稲垣中：臨床神経薬理12(7),1349-1361,2009より作成

クロザリルのお問い合わせ

デジタルコミュニケーターもしくはノバルティスダイレクトへお問い合わせください。

デジタルコミュニケーター

mailto:clozaril.remote@novartis.com

電話番号 0800-222-8814（通話料無料）

業務時間 月~金 9：00~17：30（祝日及び当社休日を除く）

ノバルティスダイレクト

電話番号 0120-003-293（通話料無料）

受付時間 月~金 9：00~17：30（祝日及び当社休日を除く）

お問い合わせ

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/point/02_conception*