

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ **2019** – □□□□ –

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **6** **15**□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **2019**□ **p.167**□

Image

		治療ステップ1	治療ステップ2 ^{*3}	治療ステップ3 ^{*3}	治療ステップ4 ^{*3}
長期管理薬	基本治療	発作の強度に応じた薬物療法	下記のいずれかを使用 ▶低用量ICS ▶LTRA ^{*1}	下記のいずれかを使用 ▶中用量ICS ▶低用量SFC ^{*2}	下記のいずれかを使用 ▶高用量ICS ▶中用量SFC ^{*2} 以下の併用も可 ・LTRA ・テオフィリン 徐放製剤
	追加治療	▶LTRA ^{*1}	▶上記治療薬を併用	上記に以下のいずれかを併用 ▶LTRA ▶テオフィリン 徐放製剤	以下を考慮 ▶ICSのさらなる増量あるいは高用量SFCへの変更 ▶抗IgE抗体 ▶全身性ステロイド薬

短期追加治療	▶貼付薬もしくは経口薬のβ ₂ 刺激薬(数日から2週間以内)
	コントロール状態が改善したら中止する。 改善が不十分ならばステップアップを考慮する。

発作治療	▶SABA頓用(改善しない場合は急性増悪(発作)への対応(3-8)を参照)
------	---------------------------------------

LTRA¹ ICS²
SABA³ β₂ SFC²

1. 1日1回、1錠を服用する。1週間以上服用しない場合は、服用再開時に1錠を服用する。
2. 1日2回、1錠を服用する。1週間以上服用しない場合は、服用再開時に1錠を服用する。
3. 1日2回、2錠を服用する。1週間以上服用しない場合は、服用再開時に2錠を服用する。

1. DSCG¹ Th2²

2. SFC⁵ SFC⁵ β₂

3. 3

□□□□□□□□□□□□□□□□ $\mu\text{g}/\square$

Image

	低用量	中用量	高用量
FP、BDP、CIC	~100	~200	~400
BUD	~200	~400	~800
BIS	~250	~500	~1,000

FP□□□□□□□□□□BDP□□□□□□□□□□CIC□□□□□□□□
BUD□□□□□□□□ BIS□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□**SLM**□/□□□□□□□□□□**FP**□□□□□□□□□□**SFC**□□□□□□□□

Image

用量	低用量	中用量	高用量
FP/SLM ($\mu\text{g}/\text{日}$)	100/50	200/100	400~500/100
使用例	SFC 50エアゾール 1回1吸入 1日2回	SFC 100 DPI 1回1吸入 1日2回	中用量SFC+中用量 ICS あるいはSFC 250DPI* 1回1吸入 1日2回

*□□□□□□□□

SFC 50 μg □□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□ FP 50 $\mu\text{g}/\text{SLM}$ 25 μg
100 μg DPI□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□ FP 100 $\mu\text{g}/\text{SLM}$ 50 μg

□□□□□□

□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

[PFS](#)

[IC](#)

[IC](#)

[IgE](#)

Image



Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/asthma/guideline_child