

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ **2019** – □□□□ –

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**6** **15**□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**2019**□**p.167**□

Image

		治療ステップ1	治療ステップ2*3	治療ステップ3*3	治療ステップ4*3
長期管理薬	基本治療	発作の強度に応じた薬物療法	下記のいずれかを使用 ▶低用量ICS ▶LTRA*1	下記のいずれかを使用 ▶中用量ICS ▶低用量SFC*2	下記のいずれかを使用 ▶高用量ICS ▶中用量SFC*2  以下の併用も可 ・LTRA ・テオフィリン 徐放製剤
	追加治療	▶LTRA*1	▶上記治療薬を併用	上記に以下のいずれかを併用 ▶LTRA ▶テオフィリン 徐放製剤	以下を考慮 ▶ICSのさらなる増量あるいは高用量SFCへの変更 ▶抗IgE抗体 ▶全身性ステロイド薬

短期追加治療	▶貼付薬もしくは経口薬のβ <sub>2</sub> 刺激薬(数日から2週間以内)
	コントロール状態が改善したら中止する。 改善が不十分ならばステップアップを考慮する。

発作治療	▶SABA頓用(改善しない場合は急性増悪(発作)への対応(3-8)を参照)
------	---------------------------------------

LTRA<sup>1</sup> ICS<sup>2</sup>  
SABA<sup>3</sup> β<sub>2</sub> SFC<sup>2</sup>

1. 1日1回、1錠を服用する。1週間以上服用しない場合は、服用再開時に1錠を服用する。  
2. 1日2回、1錠を服用する。1週間以上服用しない場合は、服用再開時に1錠を服用する。  
3. 1日2回、2錠を服用する。1週間以上服用しない場合は、服用再開時に2錠を服用する。

1. DSCG<sup>1</sup> Th2<sup>1</sup>

2. SFC<sup>5</sup> SFC<sup>5</sup> β<sub>2</sub>

3. 3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ μg/□□

Image

	低用量	中用量	高用量
FP、BDP、CIC	~100	~200	~400
BUD	~200	~400	~800
BIS	~250	~500	~1,000

FP□□□□□□□□ BDP□□□□□□□□□□ CIC□□□□□□□□  
BUD□□□□□□ BIS□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ **SLM**□/□□□□□□□□ **FP**□□□□□□ **SFC**□□□□□□□□

Image

用量	低用量	中用量	高用量
FP/SLM (μg/日)	100/50	200/100	400~500/100
使用例	SFC 50エアゾール 1回1吸入 1日2回	SFC 100 DPI 1回1吸入 1日2回	中用量SFC+中用量 ICS あるいはSFC 250DPI* 1回1吸入 1日2回

\*□□□□□□□□

SFC 50μg□□□□□□□□□□□□□□ 1□□□ FP 50μg/SLM 25μg  
100μg DPI□□□□□□□□□□□□□□ FP 100μg/SLM 50μg

□□□□□□

□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

[PFS](#)

[IC](#)

[IC](#)

[IgE](#)

Image



---

**Source URL:** [https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/asthma/guideline\\_child](https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/asthma/guideline_child)