

2. 血清 IgE 30-1,500 IU/L

3. 血清 IgE > 1,500 IU/L

4. 血清 IgE > 1,500 IU/L

5. 血清 IgE > 1,500 IU/L

6. 血清 IgE > 1,500 IU/L

7. LABA, LTRA, ICS

8. 12 个月

9. 18 个月

10. ICS

3. 4 (2019 p.73)

④ 4/ +

ICS, LABA, LAMA, LTRA, IgE, IL-5, IL-5 α , IL-4 α , BT

IgE 30-1,500 IU/L

16

0.5mg/kg

1 5mg

1 1 BT

2 (2019 p.71)

Image

	気管支拡張	抗炎症	リモデリング抑制	気道分泌抑制
吸入ステロイド薬	0	5	4	3
長時間作用性 β_2 刺激薬	5	1	0	亢進
ロイコトリエン受容体拮抗薬	2	4	3	2
テオフィリン徐放製剤	4	2	1	0
長時間作用性抗コリン薬 (チオトロピウムソフトミスト)	5	1	0	5
抗IgE抗体製剤	0	5	2	0
抗IL-5抗体製剤	0	5	不明	0
抗IL-5R α 抗体製剤	0	5	不明	0

05

5

2019 p.78)

Image

□□□□□□□□□□

[IC□□□□□□□□□□](#)

[IC□□□□□□□□□□](#)

□□□□□□

[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□](#)

[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□](#)

[□□□□□□□□](#)

[IgE□□□□□□](#)

Image



Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/asthma/guideline>