


□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

Image



注

1. 服薬コンプライアンスを十分確認すること。
2. 治療1あるいは2のどちらかもしくは両方に非定型抗精神病薬を含むこと。
3. 非定型抗精神病薬が併用されている場合は、クロルプロマジン換算で最も投与量が多い薬剤を対象とする。
4. 定型抗精神病薬については、1年以上の治療歴があること。
5. **治療に反応が見られない:** GAF評点が41点以上に相当する状態になったことがないこと。GAF (Global Assessment of Functioning) 41-50: 重大な症状, または社会的, 職業的, または学校の機能におけるなんらかの深刻な障害

□□□□□□□□□□2023□10□□□□□□□□3□□□□□

GAF□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□

Image

## ◆GAF 40～31イメージ

現実検討かコミュニケーションに  
いくらかの欠陥



仕事や学校、家族関係、判断、思考、  
または気分など多くの面での重大な欠陥



\*機能の全体的評定(GAF)尺度

40  
}  
31

現実検討かコミュニケーションにいくらかの欠陥（例：会話は時々非論理的、あいまい、または関係性がなくなる）、  
**または**、仕事や学校、家族関係、判断、思考、または気分など多くの面での重大な欠陥（例：抑うつ的な男が友人を避け、家族を無視し、仕事ができない。子供がしばしば年下の子供をなぐり、家庭では反抗的であり、学校では勉強ができない）

## ◆GAF 30～21イメージ

行動は妄想や幻覚に  
相当影響されている



ほとんどすべての面で  
機能することができない



30  
}  
21

行動は妄想や幻覚に相当影響されている、  
**または**コミュニケーションが判断に重大な欠陥がある（例：時々、滅裂、ひどく不適切にふるまう、自殺の考えにとらわれている）、  
**または**、ほとんどすべての面で機能することができない（例：1日中床にしている、仕事も家庭も友達もない）。

## ◆GAF 20～11イメージ

自己を傷つける危険がかなりある



他者を傷つける危険がかなりある



20  
}  
11

自己または他者を傷つける危険がかなりあるか（例：はっきりと死の可能性を意識しない自殺企図、しばしば暴力的になる、躁病性興奮）、  
**または**、時には最低限の身の清潔維持ができない（例：大便を塗りたくる）。  
**または**、コミュニケーションに重大な欠陥（例：大部分滅裂が無言症）

## ◆GAF 10～1イメージ

自己をひどく傷つける危険が  
続いている



他者をひどく傷つける危険が  
続いている



10  
}  
1

自己または他者をひどく傷つける危険が続いている（例：暴力の繰り返し）、  
**または**最低限の身の清潔維持が持続的に不可能、  
**または**、はっきりと死の可能性を意識した重大な自殺行為

Global Assessment of Functioning

## The Global Assessment of Functioning

<b>100-91</b>	Very good
<b>90-81</b>	Good
<b>80-71</b>	Moderately good
<b>70-61</b>	Moderate
<b>60-51</b>	Mildly impaired
<b>50-41</b>	Moderately impaired
<b>40-31</b>	Severely impaired
<b>30-21</b>	Very severely impaired
<b>20-11</b>	Extremely severely impaired
<b>10-1</b>	Unreliable
<b>0</b>	Not available

American Psychiatric Association, DSM-IV-TR, p.43-44, 2003

Novartis

Novartis Pharmaceuticals Corporation

Novartis Pharmaceuticals Corporation

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

1-800-222-8814

9:00 AM - 3:30 PM (ET)

Novartis

