


□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

Image



注

1. 服薬コンプライアンスを十分確認すること。
2. 治療1あるいは2のどちらかもしくは両方に非定型抗精神病薬を含むこと。
3. 非定型抗精神病薬が併用されている場合は、クロルプロマジン換算で最も投与量が多い薬剤を対象とする。
4. 定型抗精神病薬については、1年以上の治療歴があること。
5. **治療に反応が見られない:** GAF評点が41点以上に相当する状態になったことがないこと。GAF (Global Assessment of Functioning) 41-50: 重大な症状, または社会的, 職業的, または学校の機能におけるなんらかの深刻な障害

□□□□□□□□□□2023□10□□□□□□□□3□□□□□

GAF□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□

Image

## ◆GAF 40～31イメージ

現実検討がコミュニケーションに  
いくらかの欠陥



仕事や学校、家族関係、判断、思考、  
または気分など多くの面での重大な欠陥



\* 機能の全体的評定（GAF）尺度

40  
}  
31

現実検討がコミュニケーションにいくらかの欠陥（例：会話は時々非論理的、あいまい、または関係性がなくなる）、  
または、仕事や学校、家族関係、判断、思考、または気分など多くの面での重大な欠陥（例：抑うつ的な男が友人を避け、家族を無視し、仕事ができない。子供がしばしば年下の子供をなぐり、家庭では反抗的であり、学校では勉強ができない）

## ◆GAF 30～21イメージ

行動は妄想や幻覚に  
相当影響されている



ほとんどすべての面で  
機能することができない



30  
}  
21

行動は妄想や幻覚に相当影響されている、  
またはコミュニケーションが判断に重大な欠陥がある（例：時々、滅裂、ひどく不適切にふるまう、自殺の考えにとらわれている）、  
または、ほとんどすべての面で機能することができない（例：1日中床についている、仕事も家庭も友達もない）。

## ◆GAF 20～11イメージ

自己を傷つける危険がかなりある



他者を傷つける危険がかなりある



20  
}  
11

自己または他者を傷つける危険がかなりあるか（例：はっきりと死の可能性を意識しない自殺企図、しばしば暴力的になる、躁病性興奮）、  
または、時には最低限の身の清潔維持ができない（例：大便を塗りたくる）。  
または、コミュニケーションに重大な欠陥（例：大部分滅裂が無言症）

## ◆GAF 10～1イメージ

自己をひどく傷つける危険が  
続いている



他者をひどく傷つける危険が  
続いている



10  
}  
1

自己または他者をひどく傷つける危険が続いている（例：暴力の繰り返し）、  
または最低限の身の清潔維持が持続的に不可能、  
または、はっきりと死の可能性を意識した重大な自殺行為



