

Clozapine 1202 3

Clozapine 1202 3

Clozapine LX100-129 1202 3

■ 1

Clozapine 1202 3

■ 2

Clozapine 1201 19 1

■ 3

19 1

■ 4

Clozapine 1202 3

■ 5

Clozapine 1202 3 1 4

1. Clozapine 4
2. 1 100mg
3. 200mg/ 300mg/ 3 1
4. 1 600mg 1 600mg 1 900mg 1 600mg

■ 6

Clozapine 1202 3 2

■ 7

2006年12月31日

12.5mg 25mg 2 25mg 1 1
3 25mg 3 1 200mg 1 50mg 2 3
1 200 400mg 2 3 1 4
1 100mg 1 600mg

■ 目的

目的

目的

HbA1c

目的

目的

1. BPRS

18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. PANSS Positive and Negative Syndrome Scale

30 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

■ 目的

BPRS PANSS DIEPSS AIMS

■ 目的

BPRS
BPRS
20%

■

18
18
14 77.8%
13 72.2%
12 66.7%
10 55.6%
1
1
1
1

Image

副作用 (クロザリルとの関連が疑われる有害事象) (発現率20%以上のみ)

副作用 (MedDRA PT)	N=18		副作用 (MedDRA PT)	N=18	
	n(%)			n(%)	
副作用発現症例数	18(100.0)		血中クレアチン・ホスホキナーゼ(CPK)増加	6(33.3)	
白血球数増加	14(77.8)		血中プロラクチン増加	6(33.3)	
傾眠	13(72.2)		血中トリグリセリド増加	5(27.8)	
アラニン・アミノトランスフェラーゼ(ALT)増加	12(66.7)		γ-グルタミルトランスフェラーゼ(ALP)増加	5(27.8)	
流涎過多	10(55.6)		白血球数減少	5(27.8)	
嘔気	8(44.4)		便秘増悪	5(27.8)	
血中アルカリホスファターゼ(ALP)増加	7(38.9)		振戦	5(27.8)	
血中甲状腺刺激ホルモン減少	7(38.9)		起立性低血圧	5(27.8)	
嘔吐	7(38.9)		体重増加	4(22.2)	
けん怠感	7(38.9)		頭痛	4(22.2)	
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)増加	6(33.3)		洞性頻脈	4(22.2)	


■

BPRS
BPRS
1201
26
-17.5±10.33
70.6
12/17
210
-22.0±10.41
84.6
11/13
4
26
350.6±114.68mg/
210
365.4±129.72mg/

BPRS
20%

Image

長期投与例におけるBPRS合計スコア変化量とクロザリル1日投与量の推移



3 Clozapine LX100-129 CLEX123 J1202

1201

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

0800-222-8814

9 00 17 30

□□□□□□□□□□

□□□□ 0120-003-293□□□□□□□□

□□□□ □□□ 9□00□17□30□□□□□□□□□□□□□□

[□□□□□□](#)

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/clinical/04>