

※3 BPRS[®]18項目のスコアは、患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。スコアは1から7の範囲で、1は最も軽微な病状を示し、7は最も重度の病状を示します。

特徴

- 患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。
- 患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。
- DIEPSS[®]は、患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。DIEPSS[®]のスコアは1,613項目のスコアを示します。
- CGI-C[®]は、患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。CGI-C[®]のスコアは1,539項目のスコアを示します。
- BPRS[®]は、患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。BPRS[®]のスコアは1,539項目のスコアを示します。paired t-検定を用いて、患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。
- 患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。

患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。CLEX123J1401は、患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。患者の病状の重症度を評価するための指標として用いられます。

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

お問い合わせ 0800-222-8814

お問い合わせ 9:00-17:30

お問い合わせ

お問い合わせ 0120-003-293

お問い合わせ 9:00-17:30

お問い合わせ