

※3 BPRS[®]18項目のスコアを比較し、BPRS[®]18項目のスコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。

結果

- 比較群間のスコア差は有意であった。
- 比較群間のスコア差は有意であった。
- DIEPSS[®]スコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。
- CGI-C[®]スコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。
- BPRS[®]スコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。
- paired t-検定によるスコア差の有意性を比較した。

Novartis Pharmaceuticals Corporation, CLEX123J1401
22nd Floor, 1107-1139, 2019
Novartis Pharmaceuticals Corporation, CLEX123J1401

[お問い合わせ](#)

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

0800-222-8814

9:00-17:30

お問い合わせ

0120-003-293

9:00-17:30

[お問い合わせ](#)