

※3 BPRS[®]18項目のスコアを比較し、BPRS[®]18項目のスコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。

結果

- 比較群間のスコア差は有意であった。
- 比較群間のスコア差は有意であった。
- DIEPSS[®]スコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。
- CGI-C[®]スコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。
- BPRS[®]スコアが1.0未満、2.0未満、3.0未満、4.0未満、5.0未満、6.0未満、7.0未満の患者の割合を比較した。
- paired t-検定を用いて比較した。
- 有意差はp<0.05と定義した。

Novartis Pharma AG, CH-4002 Basel, Switzerland
CLEX123J1401
試験番号: 2211, 1107-1139, 2019
試験期間: 2019年11月11日 - 2019年11月13日

[お問い合わせ](#)

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

電話 0800-222-8814

電話 0900-1730

お問い合わせ先

電話 0120-003-293

電話 0900-1730

[お問い合わせ](#)