NOVARTIS

ルセンティス□安全性情報□未熟児網膜症

ルセンティス□副作用について

- 加齢黄斑変性
- 網膜静脈閉塞症
- 病的近視
- 糖尿病黄斑浮腫
- 未熟児網膜症

未熟児網膜症

【ROP】国際共同試験

未熟児網膜症の患者（日本人を含む）を対象とした国際共同第Ⅲ相臨床試験では、本剤0.2mgが投与された73例中11例（15.1%）に副作用が認められました。主な副作用は、結膜出血6例（8.2%）でした。眼以外の副作用は認められませんでした。日本人患者では9例中2例に副作用が認められ、主な副作用は、結膜出血1例、角膜浮腫1例でした。（効能又は効果の一変承認時までの集計）

Image

安全評価対象例数	73例	副作用発現率	15.1%
副作用発現例数	11例		

Image

副作用名	発現例数（%）
	ROP
眼障害	11（15.1%）
結膜出血	6（8.2%）
網膜出血	2（2.7%）
白内障	1（1.4%）
角膜浮腫	1（1.4%）
虹彩癒着	1（1.4%）
縮瞳	1（1.4%）

Image

網膜症の情報は
網膜ドットコム
›

弊社製品についてのお問い合わせ

お問い合わせ

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/lucentis/sideeffect/04*