



再発型
(再発に依らない障害進行がない)



進行型
(再発に依らない障害進行がある)



※1：活動性は、臨床的再発および/またはMRI上の活動性（新規または新規拡大T2病変の有無を1年に1回以上評価）により規定される。評価できなかった場合の活動性は“indeterminate（不明）”とする
 ※2：臨床的な活動性が認められ、MS診断基準を満たしたCISの場合は、再発寛解型MSとする
 ※3：臨床評価に基づく進行は1年に1回以上評価する。評価できなかった場合の活動性・進行は“indeterminate（不明）”とする

1 Lublin FD et al Neurology 83(3): 278-286, 2014

MSの診断基準は、臨床的再発および/またはMRI上の活動性（新規または新規拡大T2病変の有無を1年に1回以上評価）により規定される。評価できなかった場合の活動性は“indeterminate（不明）”とする

MS

MSの診断基準は、臨床的再発および/またはMRI上の活動性（新規または新規拡大T2病変の有無を1年に1回以上評価）により規定される。評価できなかった場合の活動性は“indeterminate（不明）”とする


CIS⁴⁰

CISはMSの診断基準を満たした臨床的孤立症候群（CIS）を指す。CISは、24ヶ月以内に1回以上の臨床的孤立症候群（CIS）を経験した患者を指す。

MSの診断基準は、臨床的再発および/またはMRI上の活動性（新規または新規拡大T2病変の有無を1年に1回以上評価）により規定される。評価できなかった場合の活動性は“indeterminate（不明）”とする

2010年、MSの診断基準は、臨床的再発および/またはMRI上の活動性（新規または新規拡大T2病変の有無を1年に1回以上評価）により規定される。評価できなかった場合の活動性は“indeterminate（不明）”とする

CISはMSの診断基準を満たした臨床的孤立症候群（CIS）を指す。CISは、24ヶ月以内に1回以上の臨床的孤立症候群（CIS）を経験した患者を指す。



8 Baecher-Allan C et al. Neuron 97(4): 742-768, 2018

Reference

1 Lublin FD et al. Neurology 83(3): 278-286, 2014
 2 Belachew S. Neurodegener Dis Manag 8(1): 9-12, 2018
 3 Lublin FD et al. Neurology 46(4): 907-911, 1996
 4 2017 p101 p105-106 p114-118 2017
 5 Kuhle J et al. Mult Scler. 21(8): 1013-24. 2015
 6 Willis MA et al. Continuum (Minneapolis, Minn.) 22(3): 785-798, 2016
 7 Kappos L et al. Lancet 391(10127): 1263-1273, 2018
 8 Baecher-Allan C et al. Neuron 97(4): 742-768, 2018

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/ns/ms/pathology/dt>