

## HIDS

### 

### 

IgD N2301 169 8 47 27.8  
 13 7.7% 5 3.0%

### 

## Image

|           |          |
|-----------|----------|
| 副作用評価対象例数 | HIDS 68例 |
| 副作用発現例数   | 18例      |
| 副作用発現症例率  | 26.5%    |

| 副作用の種類            | 発現例数(%) |
|-------------------|---------|
| 胃腸障害              | 4 (5.9) |
| 悪心                | 1 (1.5) |
| 下痢                | 2 (2.9) |
| 口腔内潰瘍形成           | 1 (1.5) |
| 上腹部痛              | 1 (1.5) |
| 腹痛                | 1 (1.5) |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | 5 (7.4) |
| 注射部位反応            | 3 (4.4) |
| 注射部位腫脹            | 1 (1.5) |
| 発熱                | 2 (2.9) |
| 感染症および寄生虫症        | 9(13.2) |
| インフルエンザ           | 1 (1.5) |
| ウイルス性気管支炎         | 1 (1.5) |
| せつ                | 1 (1.5) |
| 外陰部腫カンジダ症         | 3 (4.4) |
| 気管支炎              | 1 (1.5) |
| 急性中耳炎             | 1 (1.5) |
| 口腔ヘルペス            | 1 (1.5) |
| 中耳炎               | 2 (2.9) |
| 扁桃炎               | 1 (1.5) |
| 猩紅熱               | 1 (1.5) |

| 副作用の種類           | 発現例数(%) |
|------------------|---------|
| 筋骨格系および結合組織障害    | 1 (1.5) |
| 関節痛              | 1 (1.5) |
| 筋肉痛              | 1 (1.5) |
| 血管障害             | 1 (1.5) |
| 高血圧              | 1 (1.5) |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害    | 1 (1.5) |
| 鼻漏               | 1 (1.5) |
| 神経系障害            | 2 (2.9) |
| 頭痛               | 2 (2.9) |
| 皮膚および皮下組織障害      | 1 (1.5) |
| 寝汗               | 1 (1.5) |
| 臨床検査             | 2 (2.9) |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 (1.5) |
| 体重増加             | 1 (1.5) |

赤字：国内でもみられた副作用

承認時社内集計

□□□□□□□□□□□□/N2301□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

---

**Source URL:** [https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/hids\\_mkd/clinical\\_02](https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/hids_mkd/clinical_02)