





※1

※2

5

## 2

Image


年齢(歳)	平均値(S.D.)	14.8(11.4)
	16歳未満	11 (57.9)
	16歳以上	8 (42.1)
性別	男	12 (63.2)
	女	7 (36.8)
フェノタイプ	FCAS	0
	MWS	7 (36.8)
	NOMID	12 (63.2)
NALP3遺伝子変異	陽性	17 (89.5)
	陰性	2 (10.5)
Anakinra(国内未承認)の治療歴	あり	10 (52.6)
	なし	9 (47.4)

n=19, n(%)又は平均値(S.D.)

## 3


24 169 18 14 77.8 19 16 84.2

Image



24 48 19 18 94.7 19 100

Image



4週間未満 15日間 29日間未満

15日間未満 9日間 15日間未満 6日間未満  
29日間未満 10日間 29日間未満 7日間未満

Image


	15日までに増量しなかった患者 (n=9)		29日までに増量した患者 (n=10)	
	n		n	
	あり	なし	あり	なし
寛解*	6	3	7	3
臨床的寛解	9	0	10	0
血清学的寛解	6	3	7	3

\* 15日間未満 15日間未満 29日間未満 29日間未満

5週間未満

8週間未満


Image



## 6 CRP SAA


CRP SAA 8 15 CRP SAA 1.00  
 0.0 6.2 mg/dL 46.26 0.0 301.0 μg/mL CRP 1mg/dL  
 SAA 10 μg/mL

Image



CRP : C-Reactive Protein (C反応性タンパク)

Image



SAA : Serum Amyloid A (血清アミロイドA)

## 7

48 19 12 63.2 3 15.8 2 10.5  
 2 1

8

19 3 3 1

1 D2308

1. /A2102

Source URL: [https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/caps/clinical\\_01](https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/caps/clinical_01)