

ルセンティス® 硝子体内注射液10mg/mLの使用方法




準備


「ルセンティス® 硝子体内注射液10mg/mL」および同梱されている「専用フィルター付き採液針」を取り出します。

別途1mLの注射筒と30ゲージの眼科用針を準備します。


本剤は注射前に室温に戻してください。また、注射筒内に吸引した薬液に不溶性微粒子又は変色を認めた場合には使用しないでください。



1 添付の専用フィルター付き採液針を1mL注射筒に無菌条件下で取り付けます。



4 専用フィルター付き採液針の中に注射液が残らないよう、プランジャーを十分に引きまします。




専用フィルター付き採液針をバイアルに残したまま、注射筒を専用フィルター付き採液針から取り外します。

専用フィルター付き採液針は廃棄し、硝子体内投与には絶対に使用しないで下さい。


2 バイアルのゴム栓部分をアルコール綿等で消毒します。

消毒後、専用フィルター付き採液針をゴム栓の中心部に、針先がバイアルの底に着くまで差し込みます。




5 無菌条件下で30ゲージの眼科用針を注射液の入った注射筒にしっかりと装着します。

注意しながら30ゲージの眼科用針のキャップをはずします。




3 バイアル中の注射液全てを吸引します。バイアルは正立させ、吸引しやすいように若干傾けてください。



1バイアルには、薬液0.23mLが充填されています。投与量は未熟児網膜症に対しては**0.02mL**、その他の効能に対しては**0.05mL**です。

6 注射筒内の空気を抜き、注射筒内の注射液が未熟児網膜症に対しては0.02mL、その他の効能に対しては0.05mLになるように、プランジャーを押しまします。



全量投与禁止

投与量には十分ご注意ください。投与量は未熟児網膜症に対しては**0.02mL**、その他の効能に対しては**0.05mL**です。

これで投与準備は完了です。

【注意】 この後、注射針を拭かないでください。プランジャーを再度引かないでください。