


分散錠の飲み方(コップを使用する場合)

用意するもの：コップ(100mL以下の小さいもの)、スプーン、水



コップに約25mLの水※1を注ぎ、その中にアフィニール®分散錠を1回服用分入れ、3分間※2放置します。



スプーンでやさしくかき混ぜ、全量を服用します。



コップに残った薬は再度、約25mLの水を加えて溶かし、全量を服用します。

※1 水の量は目安です。正確である必要はありません。

※2 3分以上置けば服用できます。調製したお薬は1時間以内に服用してください。

分散錠の飲み方(シリンジを使用する場合)

用意するもの：シリンジ(10mL程度のもの)、コップ、水




アフィニール®分散錠をシリンジに入れ、プランジャーを奥まで差し込みます。



コップからゆっくりと約5mL^{*1}の水を吸い上げ、逆さまに持って空気を約1mL吸いこみ、コップに立てかけて分散錠が溶けるまで3分間^{*2}放置します。



分散錠が溶けているのを確認し、シリンジを注意深く5回程度上下に転倒させて振り混ぜます。上に向けてもち、余分な空気を抜いてから全量を患者さんの口に投与します。



シリンジの中に残ったお薬を溶かすために、再度水を適量吸い上げて空気を1mL吸い込み、円を描くように振り混ぜます。余分な空気を抜いてから全量を投与します。

※1 水の量は目安です。正確である必要はありません。

※2 3分以上置けば投与できます。調製したお薬は1時間以内に投与してください。