

## 使用上の注意

### 点眼時

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 他の点眼液も使用している場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼してください。
- コンタクトレンズをしている方は、コンタクトレンズをはずしてから点眼してください。また点眼後は10分以上経過してからコンタクトレンズを装用してください。

### 開封後

- 光に当たらないように添付の遮光袋に入れて保存してください。
- 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

### その他

- 目が痛い、目やまぶたが赤くなる、目やまぶたの周りが腫れる、目やまぶたがかゆい、頭痛がするなどの症状があらわれた場合、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。
- その他、点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

医院・病院名

協和キリン株式会社

ノバルティス ファーマ株式会社

KK-18-09-23190(1904)  
PTN0014E08J  
PAT00007GK0002  
2019年7月作成

# パタール®点眼液0.1% を使用される方へ

この点眼液は、  
アレルギー性結膜炎を治療するお薬です。



※本剤は、5mLの点眼液を8mLの容器に入れてあります。  
(持ちやすく、点眼しやすいように大きな容器を用いています)

YOWA KIRIN

NOVARTIS



# 点眼方法

パタール®点眼液0.1%を使用される方へ

※他の容器などに入れ替えることは、薬剤の質を変えてしまうおそれがありますので、おやめください

1

点眼前には手をきれいに洗ってください。



2

点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

点眼液に細菌などが入るのを防ぐため、容器の先端を目から離し、1滴点眼してください。



3

点眼液が目のまわりについたときは、ティッシュや清潔なタオルでふき取ってください。点眼後は目を閉じて、目頭を1～5分程度軽く押さえてください。

点眼液が鼻などに流れ込むのを防ぐため、目頭のあたりを指で押さえるようにしてください。



## 上手に1滴点眼するコツ

この点眼液は容器の横を押すと点眼できます(図1)。また、容器の底の部分を押しても1滴出ます(図2)。




図1




図2