

リバスチグミン経皮吸収型製剤
(イクセロン®パッチ、リバスタッチ®パッチ)
適正使用のお願い
— 「過量投与」及び「カット」について —

医療関係者の皆様

2017年3月
ノバルティスファーマ株式会社
小野薬品工業株式会社

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、リバスチグミン経皮吸収型製剤 [イクセロン®パッチ (ノバルティスファーマ)、リバスタッチ®パッチ (小野薬品工業) ; 以下、本剤] を処方された患者様において、本剤のはがし忘れや複数枚同時使用による過量投与、及び本剤をカットして使用する等、投与量に関わる誤使用の事例が報告されています。つきましては、以下の点について患者様及び介護者の方等にご指導いただきますよう、お願い申し上げます。

【以下の事項について、患者様及び介護者の方等にご説明ください。】

- **本剤は1日1枚ずつ24時間ごとに貼り替え、貼り替えの際は先に貼付しているパッチを除去したことを十分確認**してください。

本剤を貼り替える際、貼付しているパッチを除去せずに新たなパッチを貼付したために過量投与となり、重篤な副作用が発現した例が報告されています。貼付24時間後でも本剤の成分がパッチに残っていますので、必ず前回のパッチをはがしてから新しいパッチを貼ってください。

- **本剤は医療従事者又は介護者等のもとで使用し、患者様が誤って使用する可能性がある場合には介護者の方が薬剤を適切な場所に保管**してください。特に**シップ等と混同しないように注意**してください。

患者様ご本人が投与量を誤認している事例や、他の貼付剤(シップ等)と誤解して複数枚貼付した事例が報告されています。また、介護者の方もこのような誤使用のないよう注意して取り扱ってください。

- 本剤は**カットして使用しない**でください。

本剤をカットして使用した場合の有効性及び安全性は確認されておりません。

今後とも、本剤の適正使用にご理解とご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

イクセロン®パッチ
ノバルティスファーマ株式会社
ノバルティスダイレクト
〒105-6333 東京都港区虎ノ門 1-23-1
0120-003-293
www.novartis.co.jp

リバスタッチ®パッチ
小野薬品工業株式会社
くすり相談室
〒541-8564 大阪市中央区久太郎町 1-8-2
0120-626-190