

# ネオラル<sup>®</sup>カプセルを服用される方へ

## 注意:以下の場合は必ず主治医に相談してください

- 薬を服用して発疹などが出たことがある。
- ほかに薬を服用している。(薬局で買った薬も)
- 妊娠または授乳中である。
- 最近予防接種を受けた、もしくは予防接種を受ける予定がある。

## 服用について

- ネオラル<sup>®</sup>カプセルと一緒に服用してはいけないお薬**：ネオラル<sup>®</sup>カプセルは以下のお薬と一緒に服用することはできません。これらのお薬を服用している場合や、あるいはこれらのお薬を医師から処方された場合は必ず医師または薬剤師にお知らせください。
  - 免疫抑制下で生ワクチンを接種すると発症するおそれがあるためネオラル<sup>®</sup>カプセルを服用中は生ワクチンを接種できません。  
生ワクチン(乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経口生ポリオワクチン、乾燥BCG等)
  - 重篤な副作用を発症するおそれがあるため、以下のお薬は服用することはできません。  
プロGRAF<sup>®</sup>/グラセプター<sup>®</sup>(タクロリムス)(外用剤を除く)、リバロ<sup>®</sup>(ピタバスタチン)、クレストール<sup>®</sup>(ロスバスタチン)、トラクリア<sup>®</sup>(ボセンタン)、ラジレス<sup>®</sup>(アリスキレン)、グラジナ<sup>®</sup>(グラズプレビル)、パルモディア<sup>®</sup>(ペマフィブラート) ( )内は一般名
- 併用での注意**：このお薬(カプセル)を服用しているときにグレープフルーツジュース\*を飲むと、この薬の作用が強くなる可能性があることが知られていますので、避けてください。  
※一部のかんきつ類(グレープフルーツ、ブンタン、スウィーティーなど)には、この薬の作用を強める成分が含まれていますので、なるべく食べることは避けてください。  
セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む健康食品といっしょに服用すると、この薬の作用が弱くなる可能性があることが知られていますので、避けてください。
- 服用方法**：このお薬は、服用する直前にアルミシートから取り出してください。また、必ず指示に従い、指定された数のカプセルをコップ1杯の水またはぬるま湯といっしょに服用してください。
- 服用し忘れた場合**：気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間は5時間以上間隔をあけてください。  
**絶対に2回分をまとめて1度には服用しないでください。**
- あやまって多く服用した場合**：すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- 高齢者の方へ**：特に指示を守って服用してください。
- その他**：自分の判断で服用をやめたり、この薬のかわりにサンディミュン<sup>®</sup>を服用しないでください。



裏面も必ずご覧ください。

## 保管上の注意

- 服用直前まで、薬の包装のまま保存してください。  
カプセルを包装から取り出したままにすると、カプセルが柔らかくなったり、カプセル内に含まれている成分が蒸発することがあります。
- 車の中や、室内の高温になる場所を避けて保存してください。
- 直射日光を避けて保存してください。
- 湿度の高い場所を避けて保存してください。
- シートをはさみなどで切って保存する場合は、ポケット部分を切らないように注意してください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。

## カプセルの外観について

- 光沢に差のあるカプセルがありますが、どちらもお薬のききめは変わりありません。

	10mg	25mg	50mg
光沢の弱いカプセル			
光沢の強いカプセル			

## 主治医または薬局の連絡先

ノバルティス ファーマ株式会社

NOVARTIS DIRECT

0120-003-293

受付時間：月～金 9：00～17：30  
(祝日及び当社休日を除く)

[www.novartis.co.jp](http://www.novartis.co.jp)